

Hirudoid® forte Gel

MEDINOVA

Eigenschaften/Verwendungszweck

Was ist Hirudoid forte Gel und wann wird es angewendet?

Hirudoid forte Gel enthält den heparinähnlichen Wirkstoff Heparinoid. Dieser beugt der Entstehung von Blutgerinnseln vor und fördert die Rückbildung bereits bestehender Thromben. Ausserdem werden Entzündungsprozesse und Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe beseitigt.

Hirudoid forte Gel wird angewendet

- zur vorbeugenden Venenpflege;
- bei Blutergüssen;
- bei Schwellungen.

Nach Anwendung von Hirudoid forte Gel lassen Spannungsgefühl und Schmerzen nach, Schwellungen und Ergüsse gehen zurück, die Schwere in den Beinen wird gelindert. Der Kühleffekt des Gels wird als angenehm empfunden.

Dieses Präparat wird auf ärztliche Verordnung oder Empfehlung des Apothekers auch gegen

- oberflächliche Venenentzündungen
- Venenstauungen
- zur Nachbehandlung von Krampfader-Verödungen oder -Operationen verwendet.

Ergänzungen

Was sollte dazu beachtet werden?

Sie können die Behandlung Ihrer Venenerkrankung unterstützen, indem Sie auf ausreichende Bewegung achten. Langes Sitzen oder Stehen verursacht Stauungen und belastet Ihre Venen. Vermeiden Sie auch zusätzliche Belastungen wie Alkohol und Zigaretten im Übermass, schwere oder blähende Kost, Übergewicht sowie Überhitzung durch Sonnenbaden und übertriebene Anwendung der Sauna.

Befolgen Sie auch die Ratschläge Ihres Arztes, die über die Anwendung von Hirudoid forte hinausgehen, wie z.B. Gymnastik oder das Tragen von Stützstrümpfen.

Kontraindikationen

Wann darf Hirudoid forte Gel nicht angewendet werden?

Hirudoid forte Gel soll nicht angewendet werden bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Heparinoid oder einen der anderen Inhaltsstoffe.

Vorsichtsmassnahmen

Wann ist bei der Anwendung von Hirudoid forte Gel Vorsicht geboten?

Hirudoid forte Gel darf nur auf intakter Haut angewendet werden. Bitte achten Sie darauf, dass das Gel nicht mit offenen Wunden, den Augen oder der Schleimhaut in Berührung kommt.

Bei Venenerkrankungen, die auf das Vorliegen eines Blutpfropfes (sogenannte Thromboembolie) zurückgehen, darf *nicht* massiert werden.

Wenn Ihre Beschwerden länger fortbestehen oder wenn sich die Symptome verschlechtern, sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt/ eine Ärztin aufsuchen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Medikamente (auch selbstgekaufte!) einnehmen.

Schwangerschaft/Stillzeit

Darf Hirudoid forte Gel während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind, es werden möchten oder wenn Sie stillen, sollten Sie vorsichtshalber möglichst auf Medikamente verzichten oder den Arzt um Rat fragen. Für Hirudoid forte Gel ist über ein allfälliges Risiko für das ungeborene Kind oder für Säuglinge stillender Mütter nichts bekannt.

Dosierung/Anwendung

Wie verwenden Sie Hirudoid forte Gel?

Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, mehrmals täglich einen Gelstrang von 3–5 cm (bei Bedarf auch mehr) auftragen. Bei thromboembolischen Erkrankungen darf jedoch *nicht* massiert werden.

Bei der Tube zu 100 g ist wegen der grösseren Tubenöffnung nur etwa ein Drittel der angegebenen Länge des Gelstranges anzuwenden.

Wie bei allen alkoholhaltigen Gelen sollten Sie auch über Hirudoid forte Gel keinen Verband anlegen. Für die Anwendung unter Verbänden steht die Creme zur Verfügung.

(Die Aluminiumfolie an der Öffnung der Tube lässt sich mit dem in der Verschlusskappe eingelassenen Dorn leicht durchstossen.)

Halten Sie sich an die im Prospekt angegebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Medikament wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten.

Unerwünschte Wirkungen

Welche Nebenwirkungen kann Hirudoid forte Gel haben?

Hirudoid forte Gel wird in der Regel gut vertragen. Bei besonders empfindlichen Patienten kann es in seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (Allergie) kommen. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie entsprechende Anzeichen beobachten. Bei stärkeren Reizerscheinungen sollten Sie Hirudoid forte Gel nicht mehr anwenden.

Allgemeine Hinweise

Was ist ferner zu beachten?

Hirudoid forte Gel darf nur bis zu dem auf der Tube mit «verwendbar bis» bezeichneten Datum verwendet werden.

Medikamente sind an einem trockenen Ort und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist, der über die ausführliche Fachinformation verfügt.

Zusammensetzung

1 g Gel enthält: Heparinoid (Chondroitinpolysulfat) hergestellt aus der Luftröhre des Rindes 5 mg entspr. 400 U.; Propylenglycol; Aromastoff.

Verkaufsart/Packungen

Hirudoid forte Gel erhalten Sie in Apotheken und Drogerien ohne ärztliches Rezept.

Es gibt Packungen zu 40 g und 100 g Gel.

Vertriebsfirma

Medinova AG, 8052 Zürich.

Stand der Information

Mai 1998.

Der Text wurde behördlich genehmigt und vom verantwortlichen Unternehmen zur Publikation durch die Documed AG freigegeben. © Copyright 2008 by Documed AG, Basel. Die unberechtigte Nutzung und Weitergabe ist untersagt. [10.10.2007]